

SINDROME DOLOROSO ABDOMINAL Y DIARREAS

MSc. Dr. Roberto Rafael Pérez Moreno
Profesor Auxiliar


Especialista de II Grado en Medicina Interna
2da parte


Ritmo a cuatro tiempos de la úlcera gástrica

- 1. Alimento
- 2. Calma del dolor
- 3. Reparación temprana del dolor
- 4. Nueva calma (espontánea) del dolor

Ritmo a tres tiempos de la úlcera duodenal

- 1. Alimento
- 2. Calma del dolor
- 3. Reparación tardía del dolor





Curso

- **Regular:** Procesos orgánicos
- **Irregular:** Procesos psicovegetativos,
Hormonales

Cinco C

- Cuanto
- Continuo
- Cuando
- Comidas
- Como

Interrogatorio

- **Cuanto** ¿Qué **tiempo** hace que viene padeciendo de sus dolores?
- **Continuo** ¿A través de los años de su padecimiento, su dolor se le ha presentado **continuamente** o, por el contrario, se ha presentado por temporadas, alternando con períodos de completa calma?

- ¿**Cuándo** tiene usted su crisis de dolor?
¿Durante el día o por la noche?
- **Comidas** ¿Tiene su dolor relación con las comidas?
- ¿**Cómo** le da el dolor a lo largo del día?

Síndrome Diarreico

- Sumario
- Concepto
- Clasificación de los Síndromes diarreicos
- Síndromes diarreicos agudos
- Síndromes diarreicos crónicos.

Concepto

- Conjunto de síntomas y signos, cuyo principal síntoma es la diarrea que consiste en:
- *hábito defecatorio anormal consistente en la disminución de la consistencia de las heces, que pueden llegar a alcanzar densidad*
- *líquida, que generalmente va acompañado de un aumento en el número de deposiciones (más de 3 diarias)*

Clasificacion

- Altas : Abundantes en cantidad
- Bajas: Abundantes en numero
- Agudas; Menos de 14 dias
- Subagudas: De 14 a un mes
- Cronicas: Un mes o mas

Síndrome de malabsorción

- la absorción defectuosa de cualquier nutriente, lo que conduce al incremento de las pérdidas fecales de las mismas.

- Síndromes de malabsorción primarios.
- Síndromes de malabsorción secundarios

Cuadro Clínico

- diarreas líquidas, pastosas o semilíquidas, abundantes, con restos de alimentos,
- a veces grasosas, que dejan ardor anal; astenia, anorexia marcada, pérdida de peso, aftas bucales, glositis,

Síndrome disentérico

- La tríada dada por:
- 1. Deposiciones anormales con mucus, pus y sangre.
- 2. Pujos.
- 3. Tenesmos.

- Shigelosis
- *Salmonelosis*
- *Colitis ulcerativa idiopática*
- *Colitis amebiana y esquistosomiasis*
- *Tumores malignos y benignos del recto*

Preguntas de Comprobacion

- ¿Mencione tres causas de Dolor Epigastrico Alto?
- ¿Diga el Cuadro Clinico del Sindrome Disenterico ?

BIBLIOGRAFIA

BASICA: Propedeutica clinica y Semiologia Medica. Raymundo Llanio. Tomo 2. Seccion II. Capitulo 57. Pag: 824 – 845.

- COMPLEMENTARIA: **Síndrome diarreico**
- **en el adulto. A. Villanueva Rodríguez. Medicine 2007**

Proxima Conferencia

- **Síndromes Ascítico e Ictérico**

Fin de la 2da parte

Muchas Gracias