2013

*El Laboratorio en el Diagnóstico y
el Control de la Diabetes Mellitus*

MSc. Dr. Enrique Abraham Marcel. Especialista de II Grado en Laboratorio Clínico.
Profesor Auxiliar

MSc. Dr. Jeddú Cruz Hernández. Especialista de I Grado en MGI y Endocrinología.
Profesor Auxiliar. Investigador Agregado

Dra. Pilar Hernández García. Especialista de II Grado en Laboratorio Clínico.
Profesora Auxiliar

Desarrollo de la Atención al Diabético en Cuba

Breve Historia del Diagnóstico de la DM por el Laboratorio

Por décadas

Estuvo basado en criterios de glucemia en plasma venoso, tanto en ayunas como a las 2h en una Prueba de Tolerancia a la Glucosa (75g) Oral (PTGo) 2h [criterios de 1979 del National Diabetes Data Group (NDDG)].

2009

La International Diabetes Federation (IDF) y el European Association for the study of Diabetes (EASD), recomiendan hacer el diagnóstico con hemoglobina glucosilada (HbA1c).

2010

La American Diabetes Association (ADA) acepta poder hacer el diagnóstico con HbA1c.

Pruebas Utilizadas en la Actualidad para Diagnóstico de DM

1.

Glucemia ayunas

2.

PTGo 2h 75g

3.

HbA1c

4.

Glucemia al azar

Criterios Diagnóstico de DM en Cuba

Se tienen en cuenta los criterios de la ADA:

1

Glucemia ayunas $\geq 7,0$ mmol/L (126 mg/dL)*

a

2

**Glicemia 2h en PTGo 2h 75g $\geq 11,1$ mmol/L
(200 mg/dL)***

a

3

HbA1c $\geq 6,5$ %*

a

4

**Glicemia al azar $\geq 11,1$ mmol/L con síntomas clásicos de
hiperglucemia o crisis hiperglucémica**

*En ausencia de hiperglucemia inequívoca, el resultado debe ser confirmado con la repetición de la prueba.

Criterios Diagnósticos de Prediabetes en Cuba

Se tienen en cuenta los criterios de la ADA:

Alteración de la glucemia en ayunas (AGA)

Glucemia ayunas $\geq 5,6$ (100) y $\leq 6,9$ mmol/L (125 mg/dL)*

a

Tolerancia a la glucosa alterada (TGA)

Glucemia 2h en PTGO 2h 75g $\geq 7,8$ (140) y $\leq 11,0$ mmol/L (199 mg/dL)

a

HbA1c prediabetes

HbA1c $\geq 5,7$ y $\leq 6,4$ %

Prediabetes doble: AGA + TGA

Prediabetes triple: AGA + TGA + HbA1c prediabetes

*Para la OMS: cuando glucemia ayunas $\geq 6,1$ (110) y $\leq 6,9$ mmol/L (125 mg/dL)

Criterios Diagnóstico de la Diabetes Gestacional (DG) en Cuba

Se tienen en cuenta los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificados:

**Glucemia ayunas
≥ 5,6 mmol/L
(100 mg/dL)**

**Glucemia al azar
≥ 11,1 mmol/L
(200 mg/dL)
con síntomas
clásicos de
hiperglucemia
o crisis
hiperglucémica**

**Glucemia 2h en
PTGo 2h 75g ≥
7,8 mmol/L
(140 mg/dL)**

Limitaciones de las Pruebas Diagnóstica de Laboratorio

Glucemia ayunas:

La glucemia es un
analito con una gran
variabilidad
biológica

Circadiana:
dependiente
de dieta,
ejercicio,
alcohol,
tabaco, salud,
estrés, etc.

Intrapersonal:
el impacto sobre
la glucemia de
los responsables
de la variabilidad
biológica
circadiana puede
variar de un día
a otro.

Limitaciones de las Pruebas Diagnóstica de Laboratorio

PTGo 2h 75g

La más incómoda para el paciente.

Varios requisitos de fase preanalítica.

**De las 3 pruebas diagnóstica,
es la de mayor variabilidad analítica.**

**La menos utilizada en la actualidad
para el diagnóstico rutinario de DM.**

Limitaciones de las Pruebas Diagnóstica de Laboratorio

HbA1c:

Fase Preanalítica

1

Enfermedades en las que se reduce la vida media del hematíe (anemia hemolítica, hemorragia) producen falsos negativos.

2

Embarazo y transfusiones producen falsos negativos.

3

Enfermedades en las que aumenta la vida $\frac{1}{2}$ del hematíe (anemia por déficit de hierro, vitamina B12 o ácido fólico) producen falsos positivos.

4

Sus niveles pueden variar en dependencia de la raza/etnia (glicación individual).

Limitaciones de las Pruebas Diagnóstica de Laboratorio

Correlación inexacta con valores de glucemia en algunos individuos.

A

Método de determinación estricto [certificado por el National Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP) y estandarizado para el ensayo de referencia Diabetes Control and Complications Trial (DCC)].

B

En dependencia del método utilizado, algunas condiciones clínicas como, hipertrigliceridemia, hiperbilirrubinemia, uremia, alcoholismo crónico, o uso crónico de opiáceos, salicilatos o vitamina C, pueden producir falsos positivos.

C

Más costosa y menos accesible.

D

HbA1c:
Fase
Analítica y
posanalítica
a

Ventajas de las Pruebas Dagnóstica de Laboratorio

Glucemia ayunas

- Barata y accesible.

PTGo 2h 75 g

- Ideal para hacer el diagnóstico de DG.
- Recomendada para pesquisar DM en poblaciones con bajo riesgo de la enfermedad (estudios epidemiológicos).
- Recomendada para le reclasificación posparto de la mujer que tuvo DG (6-8 semanas posparto).

Ventajas de las Pruebas Diagnóstica de Laboratorio

La menos incómoda para el paciente (no requiere necesariamente de ayuno).

HbA1c

Menos variabilidad total, dado por poca variabilidad biológica y gran estabilidad preanalítica.

En pacientes con hemoglobinopatías pero con recambio normal de eritrocitos (sickleemia), puede utilizarse un ensayo que no interfiera con la hemoglobina anormal.

Criterios de Control Glucémico de DM en Cuba

Se tienen en cuenta los criterios de la ADA:

Glucemia ayunas:
3,9-7,2 mmol/L
(70-130 mg/dL)

La glucemia
posprandial debe
preferirse a la
preprandial.

**Glucemia
posprandial:**
< 10,0 mmol/L
(180 mg/dL)

Criterios más o
menos estrictos
pueden ser apropiados
para pacientes
Individuales.

Criterios de Control de DM con HbA1c en Cuba

Se tienen en cuenta los criterios de la ADA:

1

Para la mayoría
de los adultos:
7 %.

2

Para pacientes
con DM de corta
duración, larga
expectativa de
vida y no
enfermedad
cardiovascular:
6,5 %
(estricto).

3

Para pacientes con
historia de
hipoglucemia
severa, corta
expectativa de
vida,
complicaciones
crónicas micro y
macrovasculares
avanzadas, varias
comorbilidades y
largo tiempo de
evolución : **< 8 %**
(menos estricto).

Criterios de Control Glucémico de DG en Cuba

**Se tienen en cuenta los criterios del
Programa Cubano de Atención Integral
a la Gestante con Diabetes/CCDE**

Glucemia ayunas:
3,3-5,2 mmol/L
(60-94 mg/dL)

**Glucemia
posprandial 2h:**
< 6,3 mmol/L
(114 mg/dL)

Limitaciones de las Pruebas de Laboratorio para el Control

**Glucemia
ayunas y
posprandial**

**Connotación
puntual
(fotografía de
un momento).**

HbA1c

No permite detectar magnitud de variación de niveles glucémicos (amplitud) ni horaria ni identificar hipoglucemia.

**Albúmina
glicada
(fructosamina)**

Dificultades con el método y correlación con niveles de glucosa, significación pronóstica no bien conocida.

Ventajas de las Pruebas de Laboratorio para el Control

Glucemia ayunas y posprandial

Determinación inmediata con el uso de glucómetro y su elevación se relaciona evidentemente con la aparición de complicaciones.

HbA1c

Identificación de control metabólico a largo plazo y predice fuertemente la aparición de complicaciones.

Fructosamina

Puede usarse para identificar control a largo plazo, o cuando existe hemoglobinopatía, o las variaciones de la glucemia son demasiado rápidas para ser captada por la HbA1c (embarazo).

Correlación entre la HbA1c y la Glucemia Plasmática*

HbA1c (%)	Glucemia media plasmática	
	mg/dL	mmol/L
6	126	7,0
7	154	8,6
8	183	10,2
9	212	11,8
10	240	13,4
11	269	14,9
12	298	16,5

*Basado en datos de la A1C-Derived Average Glucose (ADAG).

Gracias!