Farmacología Clínica.

Principios de la quimioterapia antimicrobiana

Curso 2014

SUMARIO

ANTIMICROBIANOS: Concepto, clasificación, aspectos que deben tenerse en cuenta para elegir un Antimicrobiano (AM). Combinación de AM. Factores que influyen en la eficacia y seguridad de los agentes AM.

CONCEPTO DE A.M.

MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS PROVOCADAS POR
MICROORGANISMOS BIOLÓGICOS

DENOMINACIONES

ANTIBIÓTICOS: Cuando son producidos por diferentes especies de microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos)

QUIMIOTERÁPICOS: Cuando se obtienen por síntesis química (Nitrofuranos, Imidazoles, Sulfonamidas, Quinolonas)

DENOMINACIONES

BACTERIOSTÁTICOS : Si son capaces de suprimir el crecimiento bacteriano

BACTERICIDAS : Cuando provocan la destrucción y muerte de microorganismos biológicos

Conceptos Básicos

CONCEPTOS

ANTIMICROBIANO: Por vía sistémica ,
generalmente, por su toxicidad selectiva

ANTISÉPTICOS: Por vía tópica por su alta
toxicidad

DESINFECTANTES: En objetos
inanimados

CONCEPTOS

INFECCIÓN: Implantación, desarrollo y acción morbosa de agentes patógenos en el organismo.

SEPSIS : Respuesta generalizada y grave a una infección

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU ESTRUCTURA QUÍMICA

1. Penicilinas
2. Cefalosporinas
3. Aminoglucósidos
4. Macrólidos
5. Tetraciclinas
6. Fenicoles
7. Polimixinas
8. Polienos
9. Sulfonamidas

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU MECANISMO DE ACCIÓN

I- Los que afectan la permeabilidad de la membrana celular del germen:

Polimixinas, Antotéricina B, Nistatina

II- Los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana: Penicilinas, Cefalosporinas, Fosfomicina, Cicloserina, Vancomicina

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU MECANISMO DE ACCIÓN

III- Los que inhiben la síntesis proteica a nivel ribosomal: Tetraciclinas, Cloranfenicol, Macrólidos, Aminoglucósidos, Lincosamidas

IV- Los que afectan la síntesis de los ácidos nucleicos: Rifampicina, Ácido Nalidíxico

V- Antimetabolitos: Sulfonamidas, Trimetoprim

Clasificación de los Antimicóticos y Antivirales

Antimicóticos

Econazol
amphotericin B
Fluconazol
Butoconazol
Miconazol
Terconazol
Ciclopirox
Butenafin
naftifine
Sertaconazol
terbinafin
Ac. undecilénico

Voriconazol
itraconazol
caspofungin
clotrimazol
Nistatin
tioconazol
ketoconazol
haloprogin
oxiconazol
sulconazol
tolnaftato,

Antivirales

Agentes Antiretrovirales

Inhibidores nucleósidos de la Transcriptasa inversa.

Zidovudina (AZT), Abacavir, Didanosina, Estavudina, Lamivudina y Zalcitabina.

Inhibidores no nucleósidos de la Transcriptasa inversa.

Efavirenz, Nevirapina y Delavirdina

Inhibidores de las proteasas.

Indinavir, Amprenavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir, Fosamprenavir, Atazanavir.

**Agentes Antivirales
(NO RETROVIRALES)**

Agentes contra herpesvirus

Agentes Anti-influenza

Agentes Antihepatitis

Otros agentes antivirales

Agentes contra herpesvirus

Acyclovir

Cidofovir

Foscarnet

Fomivirsen

Ganciclovir

Famciclovir

Idoxuridine

Penciclovir

Trifluridine

Valacyclovir

Valganciclovir

Agentes Anti-influenza

Amantadina

Oseltamivir

Rimantadina

Zanamivir

Agentes Antihepatitis

Adefovir dipivoxil

Interferon-alfa

Lamivudine

Interferon alfa pegilado

Otros agentes antiviral

Ribavirin

Imiquimod

Sitios de acción agentes antimicrobianos

Inhibidores síntesis folatos: Sulfonamidas-Trimetoprima

Inhibidor RNA polimerasa: Rifampicina

Inhibidores membrana celular: anfotericina, ketoconazol, polimixina

Inhibidores síntesis pared: Betalactámicos (carbapenems, monobactams, cefalosporina, penicilinas) Otros ATB (bacitracina, fosfomicina, vancomicina)

Inhibidor DNA girasa: Fluoroquinolonas

Inhibidores síntesis proteica: aminoglucósidos, cloramfenicol, clindamicina, macrólidos, mupirocina, estreptomina, tetraciclinas

Criterios para la selección apropiada de un antimicrobiano.

- Tener Diagnóstico clínico
- Formular Diagnóstico causal
- Identificar al germen- (cultivo)
- Hacer Test de sensibilidad (antibiograma)
- Conocer Farmacología de antimicrobianos y quimioterápicos

Usos profilácticos

FACTORES PARA LA ELECCIÓN DE UN ANTIMICROBIANO

- 1- El agente mas indicado es el MENOS TÓXICO y el de espectro MAS REDUCIDO que posea eficacia comprobada para la bacteria causal.
- 2- Los ANTIBIOGRAMAS solo ofrecen ORIENTACION TERAPÉUTICA.

FACTORES PARA LA ELECCIÓN DE UN ANTIMICROBIANO

3- Para realizar un TRATAMIENTO
EFECTIVO:

- Factores F.C. de la droga
- Factores del hospedero

4- Para evaluar las TOXICIDADES:

Monitoreo frecuente del tratamiento

ASOCIACIÓN O COMBINACIONES

DESVENTAJAS:

- 1- Falsa sensación de seguridad
- 2- Mayor COSTO
- 3- Aumento de SUPERINFECCIONES
- 4- Aumento de bacterias RESISTENTES
- 5- Aumento de REACCIONES ADVERSAS
- 6- Aparición de ANTAGONISMOS

SITUACIONES CLÍNICAS EN LAS QUE ESTÁ JUSTIFICADA LA COMBINACIÓN

1- Para tratar infecciones bacterianas mixtas, las que no son susceptibles a un agente común.

Ej: Sepsis intraabdominal secundaria a perforación intestinal (gérmenes aeróbicos y anaeróbicos)

2- En infecciones causadas por organismos que hacen RÁPIDA RESISTENCIA a la monoterapia

Ej: Tratamiento de la tuberculosis

SITUACIONES CLÍNICAS EN LAS QUE ESTÁ JUSTIFICADA LA COMBINACIÓN

3- En infecciones donde el agente infectante pasa por diferentes estadios de evolución.

Ej: Tratamiento del Paludismo

4- Para DISMINUIR LAS REACCIONES ADVERSAS del agente más efectivo

SITUACIONES CLÍNICAS EN LAS QUE ESTÁ JUSTIFICADA LA COMBINACIÓN

5- Para PREVENIR LA INACTIVACIÓN del
agente antimicrobiano. Ej:

PENICILINA mas ACIDO
CLAVULÁNICO

6- Para lograr un EFECTO SINÉRGICO .

Ej: SULFAMETOXAZOL mas
TRIMETOPRIM

ASOCIACIONES DE A.M. CON OTROS TIPOS DE DROGAS

ASOCIACION	EFEECTO
ERITROMICINA O TETRACICLINA mas DIGOXINA	CONCENTRACIONES SÉRICAS DE DIGOXINA
RIFAMPICINA mas DIGOXINA	CONCENTRACIONES SÉRICAS DE DIGOXINA

ASOCIACIONES DE A.M. CON OTROS TIPOS DE DROGAS

ASOCIACIÓN	EFECTO
AMINOGLUCÓSIDOS o CEFALOSPORINAS o PENICILINAS mas o ANTIC ORALES SULFONAMIDAS o TETRACICLINAS	<p>ACCIÓN DE ANTICOAGULANTES ORALES</p>
CLORANFENICOL o COTRIMOXAZOL mas o DPH SULFADIACINA	<p>EFFECTOS DE DIFENILHIDANTOÍNA (DPH)</p>

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE A.M.

- 1- CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS DE LAS DROGAS
- 2- CONDICIONES FISIOPATOLÓGICAS EN EL HOSPEDERO (Nefropatías, Hepatopatías, Embarazo)
- 3- EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS POSIBLES EFECTOS DEL A.M.

PENETRACIÓN DE LOS A.M. AL L.C.R

BUENA (MENINGES NORMALES)	BUENA (MENINGES INFLAMADAS)	POCO O NADA (CON MENINGES INFLAMADAS)
CLORANFENICOL SULFONAMIDAS TRIMETOPRIM RIFAMPICINA ETAMBUTOL ISONIACIDA PIRAZINAMIDA METRONIDAZOL	PENICILINA G AMPICILINA METICILINA CARBENICILINA VANCOMICINA CEF 3ra y 4ta GEN.	ESTREPTOMICINA OTROS AMINOGL. CEF. 1ra y 2da GENERACION ERITROMICINA POLIMIXINAS ANFOTERICINA B

ANTIMICROBIANOS EN LA GESTACIÓN

INOCUOS	ASOCIADOS A RIESGO	INFORMACIÓN LIMITADA
ERITROMICINA, PENICILINAS, CEFALOSPORINAS, MANDELATO DE METENAMINA	SULFONAMIDAS COTRIMOXAZOL NITROFURANTOÍNA CLORANFENICOL AMINOGLUCÓSIDOS VANCOMICINA METRONIDAZOL	LINCOMICINAS RIFAMPICINA ANFOTERICINA B

EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS EFECTOS DEL A.M.

CLORANFENICOL
(DAÑO DE LA MÉDULA ÓSEA)

SEGUIMIENTO HASTA 6 MESES
DESPUÉS

EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LOS EFECTOS DEL A.M.

AMINOGLUCÓSIDOS

(NEFROTOXICIDAD Y OTOTOXICIDAD)

ESTUDIO DE LA FUNCIÓN RENAL Y
AUDITIVA

Errores comunes que se cometen en el empleo de antimicrobianos

No diagnosticar el germen.

Inadecuada vía, dosis y duración del tratamiento.

Asociación inadecuada.

Automedicación.

Desconocimiento
farmacología
del fármaco

ASPECTOS CLINICOS A TENER EN CUENTA

I- Infección que NO responde al tratamiento:
ACCIÓN RECÍPROCA ADVERSA DE
LOS MEDICAMENTOS

ASPECTOS CLINICOS A TENER EN CUENTA

II- Estado del paciente se deteriora después de una respuesta inicial satisfactoria al tratamiento:

**SUPERINFECCIÓN POR UN
ORGANISMO RESISTENTE**